

Mesure 6

Observer les chevaux en déplacement



Les déplacements (concours, randonnées, stages, transports collectifs, saison de monte) exposent les chevaux à de nouveaux contacts et augmentent le risque de transmission de maladies infectieuses telles que la grippe équine, la rhinopneumonie ou la gourme.

Une vigilance renforcée est indispensable avant, pendant et après chaque rassemblement

AVANT LE DEPART

ANTICIPER LE RISQUE



Une préparation rigoureuse réduit significativement les contaminations :



Surveiller l'état de santé dans les jours précédents (température quotidienne, absence de toux, jetage, abattement ou diarrhée).



Ne jamais déplacer un cheval présentant des signes cliniques, même discrets.



Vérifier la mise à jour des vaccinations, notamment contre la grippe équine (et HVE selon le contexte).



Nettoyer et désinfecter le matériel de transport (van, camion).



Prévoir du matériel individuel pour éviter tout partage sur place.



Mesure 6

Observer les chevaux en déplacement



Pendant l'évènement : limiter les expositions



Éviter les contacts nez à nez.



Ne pas partager les seaux, abreuvoirs ou équipements.



Maintenir une hygiène rigoureuse des mains et du matériel.



Observer attentivement tout changement de comportement.



Au retour : surveiller et prévenir



La phase post-déplacement est déterminante :



Contrôler la température pendant 5 à 7 jours.



Surveiller l'apparition de signes respiratoires ou digestifs.



Mettre en place un isolement préventif si le contexte sanitaire l'exige.

Un seul cheval infecté peut suffire à contaminer tout un effectif. Anticipation, surveillance et réactivité constituent les piliers d'un déplacement sécurisé.



Mise à jour :
Septembre 2026