

LE LAURIER ROSE // *NERIUM OLEANDER* // APOCYNACEAE



Dose toxique

20 à 60 feuilles fraîches ou 15 à 20 séchées constituent une dose mortelle pour un cheval de 500 kg.



Parties de la plante toxique

Toute la plante. Les principaux risques d'intoxication sont : l'ingestion d'eau dans un abreuvoir où des parties de la plante ont macéré, l'ingestion de résidus de taille dispersés dans les pâturages et l'ingestion de foin contaminé par des parties de la plante.

Description de la plante



2-5 m



Vert foncé brillant sur le dessus, vert pâle terne sur le dessous, persistantes, coriaces, lancéolées, verticillées ou opposées, 5 à 20 cm de long



Gousses étroites et allongées de 15 cm, vert-brun,
Graines entourées de poils



De mai à octobre
Blanches, jaunes, rouges, différentes nuances de rose, groupées en cymes terminales, en forme de trompette, 5 pétales (fleurs simples, possible doubles ou triples), odorantes



Bourgeons floraux



Fleur triple



Gousse mûre



Feuilles

Distribution



D'origine méditerranéenne, le laurier-rose est une plante résistante à la sécheresse, particulièrement adaptée aux sols pauvres et aux milieux bien exposés au soleil. Il résiste aussi à de larges amplitudes de températures.


Parfois appelé Oléandre, il est très utilisé comme plante ornementale dans les parcs et jardins, en pleine terre (haies, massifs, taillis) dans les régions du sud de la France au climat chaud et sec, ou en pot pour être rentré l'hiver, dans les régions situées plus au nord.



Haie de lauriers roses



Laurier rose en pleine terre



Molécules toxiques pour les équidés

Le laurier rose contient des hétérosides cardiotoxiques à action digitalique, dont essentiellement de l'oléandrine, une substance qui entraîne des troubles cardiaques. La toxicité est maximale dans les feuilles.

A noter, les toxines peuvent aussi contaminer le lait des juments.



Symptômes d'intoxication

L'intoxication se manifeste par une chute de température corporelle, une dilatation des pupilles et des troubles gastro-intestinaux. Les équidés intoxiqués peuvent présenter les symptômes suivants, la mort pouvant intervenir en quelques heures voire quelques minutes par paralysie du cœur :

- Insuffisance cardiaque
- Coliques, diarrhée
- Pupilles dilatées
- Mort par arrêt cardiaque
- Avortement



Intoxication, comment réagir ?

1. Prendre les constantes du cheval : pouls, respiration, température
2. Vérifier l'état d'hydratation à l'aide du test du pli de peau
3. Vérifier l'état des muqueuses au niveau des gencives : elles doivent blanchir sous la pression de redevenir roses lorsque la pression se relâche
4. Conserver un échantillon du végétal incriminé
5. Appeler le vétérinaire et lui transmettre les informations liées à la suspicion d'intoxication alimentaire
6. Attendre le vétérinaire sans déplacer le cheval : la marche stimule la circulation, ce qui peut permettre aux substances toxiques de se répandre plus rapidement dans le corps.
7. Lui fournir de l'eau mais pas d'aliments.

LE LAURIER ROSE // NERIUUM OLEANDER // APOCYNACEAE

fiche respe octobre 2020 - G. Gault - C. Marcilleau Pittel - www.respe.net

