

# LA RENONCULE ÂCRE // *RANUNCULUS ACRIS* // RANUNCULACEAE



Faiblement  
toxique



## Dose toxique

Non connue



## Parties de la plante toxique

Toute la plante fraîche, la concentration en toxines étant la plus élevée pendant la floraison. Les renoncules rampante (*R. repens*) et bulbeuse (*R. bulbosus*) présentes dans l'environnement des équidés sont également toxiques pour ces derniers.

## Description de la plante



30-60 cm



Dressée, ramifiée, section  
ronde, lisse, poilue dans sa  
partie supérieure



Une racine pivotante et  
des racines superficielles  
fines



Basales, en rosette, ou caulinaires, simples,  
alternes, découpées, pétiolées, poilues dessus,  
glabres/poilues dessous



Akènes, comprimés,  
glabres, lisse, pourvus d'un  
bec court, arqué



De mai à juillet  
Jaunes, solitaires, 5 pétales égaux, libres, extrémité arrondie



© P. Goujan - Bio-Media Sorbonne-Université



Fleur épanouie

© P. Goujan - Bio-Media Sorbonne-Université



Akènes regroupés avant  
maturité

© P. Goujan - Bio-Media Sorbonne-Université



Bouton floral

© N. Genoux



Feuilles

## Distribution



Les renoncules, ou boutons d'or, sont très communes sur le territoire français. La renoncule âcre se rencontrent dans les prairies fraîches et plutôt pâturées, la renoncule bulbeuse dans les milieux secs et la renoncule rampante dans les sols argileux, humides et humifères.




© G. Schöber

Renoncles âcres dans un espace vert



© H. Braxmeier

Renoncles âcres dans une prairie



## Molécules toxiques pour les équidés

La renoncule âcre contient de l'anémone et de la protoanémone. Cette dernière se dégrade à la dessiccation car elle est volatile et disparaît après séchage. Les renoncles ne sont donc pas dangereuses dans les foin.

Lorsque la plante est piétinée, de l'anémone peut s'échapper, provoquant des irritations de la peau et des muqueuses.



## Circonstances d'intoxication par les équidés

La renoncule, ou bouton d'or, est âcre en frais. Elle est donc peu attractive au pâturage, les équidés en consomment rarement. Cependant, dans les prairies où les renoncles sont nombreuses, les risques de piétinement sont augmentés, entraînant des irritations de la peau et des muqueuses.



## Symptômes d'intoxication

Les cas d'intoxication ne se produisent que lorsque les équidés ingèrent des grandes quantités. Ils sont rares, les équidés ne consommant pas la renoncule en vert. Les équidés intoxiqués peuvent présenter les symptômes suivants :

- inflammations sur les zones de peau non pigmentées
- inflammations gastro-intestinales, coliques, diarrhée
- atteintes rénales, sang dans les urines
- toux, écoulement nasal
- insuffisance cardiaque



## Moyens de prévention

Les moyens de prévention pour éviter les intoxications aux renoncles sont :

- Entretenir ses pâtures pour conserver un couvert végétal homogène et de qualité.
- Assurer une bonne gestion du pâturage : éviter le surpâturage, limiter le pâturage en période sèche ou compléter en foin, faucher les refus, mettre en place un pâturage tournant et un pâturage mixte lorsque cela est possible.
- Informer et sensibiliser les cavaliers et les détenteurs d'équidés, être vigilant lors des sorties en extérieur.

## LA RENONCULE ÂCRE // RANUNCULUS ACRIS // RANUNCULACEAE

fiche respe juin 2025 - G. Gault - C. Marcillaud Pitel - [www.respe.net](http://www.respe.net)  
d'après Bruneton J (2005 et 2009), Cornevin Ch (1887), McKenzie R (2012)

